


## Nach dem Sammeln

- 4** Ziehen Sie nach der Probenahme einen Handschuh aus. Fassen Sie mit der handschuhfreien Hand das geöffnete Transportgefäß und schieben Sie mit der behandschuhten Hand den Tesafilmstreifen mit dem Objektträger in das Transportgefäß.




## Sprechen Sie uns an.

**Liebe Patientin, lieber Patient,**  
bitte wenden Sie sich bei weiteren Fragen vertrauensvoll an Ihren Arzt oder Ihr Praxisteam.

Ihr Praxisteam nimmt sich gern Zeit für Ihre Fragen:

## Probenahme bei Verdacht auf Madenwürmer (Oxyuren)

So funktioniert's



**JL** MVZ Labor Dr. Limbach  
HEIDELBERG

MVZ Labor Dr. Limbach & Kollegen GbR  
Im Breitenspiel 16 | 69126 Heidelberg  
Tel.: +49 6221 3432-0  
www.labor-limbach.de

LIMBACH  GRUPPE

## Sehr geehrte Patientin, sehr geehrter Patient,


Ihr Arzt möchte eine Laboranforderung durchführen lassen, bei der es notwendig ist, einen Nachweis mittels Klebestreifen-Abklatsch-Präparat vorzunehmen.

Es wird empfohlen, an drei aufeinanderfolgenden Tagen jeweils eine Probe zu nehmen. Die Probe wird anschließend an das Labor zur Durchführung der Analyse geschickt. Es ist wichtig, dass die Probenahme richtig durchgeführt wird.

Diese Anleitung erklärt Ihnen, wie Sie die Probenahme korrekt durchführen, die Probe kennzeichnen und richtig lagern.

### Diese Materialien benötigen Sie:

- Tesafilm (völlig durchsichtig, nicht matt)
- Objektträger
- Objektträger-Transportbehälter
- Einmalhandschuhe



## Worauf müssen Sie achten?


- Die Probenahme sollte morgens **vor** dem ersten Toilettengang und **vor** dem Waschen durchgeführt werden.
- Tragen Sie immer Einmalhandschuhe bei der Probenahme.
- Benutzen Sie immer einen völlig durchsichtigen Klebestreifen mit einer Länge von 6 cm.
- Achten Sie darauf, dass der Klebestreifen nicht mit Stuhl verunreinigt wird.
- Wiederholen Sie die Probenahme mehrfach mit ein und demselben Klebestreifen.

## So funktioniert's

- 1** Beschriften Sie das Transportgefäß. Legen Sie den Klebestreifen in greifbare Nähe und streifen Sie die Einmalhandschuhe über.



- 2** Spreizen Sie das Gesäß und tupfen Sie den Analbereich **mehrfach** mit der klebenden Seite des Tesafilmstreifens ab.



- 3** Kleben Sie den Tesafilmstreifen auf den Objektträger.

### Hinweis:

- a) Nur eine Seite des Objektträgers bekleben.
- b) Der Objektträger darf ansonsten keine weitere Beklebung haben.

