


Nach dem Sammeln

- Bitte geben Sie jede Stuhlprobe so rasch wie möglich in der Praxis ab und lagern Sie sie bis zur Abgabe an einem kühlen Ort (Kühlschrank).




Sprechen Sie uns an.

Liebe Patientin, lieber Patient,
bitte wenden Sie sich bei weiteren Fragen vertrauensvoll an Ihren Arzt oder Ihr Praxisteam.

Ihr Praxisteam nimmt sich gern Zeit für Ihre Fragen:

Gewinnung einer Stuhlprobe

So funktioniert's



ML MVZ Labor Dr. Limbach
HEIDELBERG

MVZ Labor Dr. Limbach & Kollegen GbR
Im Breitspiel 16 | 69126 Heidelberg
www.labor-limbach.de

LIMBACH  GRUPPE

Herausgeber: © Limbach Gruppe SE – 05/2016_V1

Sehr geehrte Patientin, sehr geehrter Patient,


Ihr Arzt möchte eine Laboruntersuchung vornehmen, bei der es notwendig ist, eine Stuhlprobe zu gewinnen. In seltenen Fällen ist es gegebenenfalls notwendig, 2-3 getrennte Stuhlproben zur Untersuchung einzusenden. Die Stuhlprobe wird anschließend an das Labor zur Durchführung des Tests geschickt.

Es ist wichtig, dass die Probengewinnung richtig durchgeführt wird. Besprechen Sie den Zeitpunkt der Probenentnahme vorab mit Ihrem Arzt!

Diese Anleitung erklärt Ihnen, wie Sie die Gewinnung der Stuhlprobe korrekt durchführen, die Probe kennzeichnen und richtig lagern.

Diese Materialien benötigen Sie von Ihrem Arzt:

- Transportbehälter
- Proberöhrchen mit integriertem Löffel



Worauf müssen Sie achten?

- Der Stuhl und der Löffel dürfen nicht mit Wasser, Reinigungsmitteln oder Urin in der Toilette in Berührung kommen. Dies würde das Testergebnis negativ beeinflussen.

- Es gibt zwei Arten von Toiletten, bitte beachten Sie daher folgende Hinweise:

Flachspülung mit Auffangbecken.
Deo-Mittel entfernen und nachspülen!




Tiefspülung ohne Auffangbecken.
Im Falle einer Tiefspülung kann für die Stuhlentnahme ein sogenannter Stuhlfänger hilfreich sein. (Sprechen Sie mit Ihrem Praxispersonal.)



So funktioniert's

- 1 Beschriften Sie vorab das Proberöhrchen und den Transportbehälter mit Ihrem Namen, Geburtsdatum und dem Entnahmedatum.



- 2 Entnehmen Sie bitte mehrere etwa bohngroße Proben von unterschiedlichen Stellen des Stuhls mit dem Löffel.



Soll die Untersuchung mehrmals durchgeführt werden, müssen die Proben von jeweils unterschiedlichen Stuhlentleerungen entnommen und in verschiedenen Stuhlröhrchen gesammelt werden.

Auch von auffälligen Anteilen wie Blut, Schleim oder Eiter sollten Sie Proben entnehmen.

- 3 Füllen Sie das Stuhlröhrchen mindestens bis zu etwa einem Viertel (maximal bis zur Hälfte) und verschließen Sie das Gefäß sorgfältig! Stecken Sie das Stuhlröhrchen anschließend in das Transportröhrchen.

